

**Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre
Medicamentos****RESPOSTA - SOLICITAÇÃO**

DATA: 14/07/2018

RESPONSÁVEL PELA RESPOSTA:

Anderson da Silva Adão

Thamires Ferreira Neves

PERGUNTA:

Gostaria de Informações sobre Interação entre os seguintes Fármacos:

Diclofenaco Sódico X Nimesulida

Diclofenaco Sódico X Clortalidona

Diclofenaco Sódico X Hidroclorotiazida

Aspirina / Carisoprodol X Diazepam

Cloridrato de Tramadol X Lorazepam

Fluconazol X Citalopram

Fluconazol X Carbamazepina

Fluconazol X Sinvastatina

Diclofenaco X Torsilax (cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico, paracetamol)

Diprosan (Dipropionato de Betametasona e Fosfato Dissódico de Betametasona) X Betatrinta (Dipropionato de Betametasona e Fosfato Dissódico de Betametasona)

Diprosan/Betatrinta X Diclofenaco Sódico

Diprosan/Betatrinta X Nimesulida

BIBLIOGRAFIA

1. IBM Micromedex. Disponível em:

< <http://www-micromedexsolutions-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/micromedex2/librarian>>. Acesso em 14 de julho de 2018.

RESPOSTA:**Diclofenaco Sódico X Nimesulida**

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|--|---|---|
| <p>A co-administração de diclofenaco com outro AINE ou salicilato pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal, incluindo hemorragias graves, com pouco ou nenhum aumento de eficácia. Esse uso concomitante deve ser evitado (cápsulas orais Prod Info ZORVOLEX®, 2016; patch tópico Prod Info FLECTOR® PATCH, 2016; injeção intravenosa Prod Info DYLOJECT (TM), 2016). Não use solução tópica de diclofenaco com um AINE oral, a menos que se espere que os benefícios superem os riscos. Se o uso concomitante for necessário, realizar avaliação laboratorial periodicamente (solução tópica Prod Info PENNSAID®, 2016)</p> | <p>Importante A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves.</p> | <p>O uso concomitante de DICLOFENAC e AINEs e SALICYLATES pode resultar em aumento do risco de sangramento.</p> |

Diclofenaco Sódico X Clortalidona

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|--|---|--|
| <p>O risco de toxicidade renal aumenta com o uso combinado de AINEs e diuréticos e o uso de AINEs com diuréticos tiazídicos reduziu o efeito natriurético do diurético em alguns pacientes. Durante a utilização concomitante de AINEs e diuréticos, monitorize os sinais de agravamento da função renal e assegure a eficácia diurética, incluindo efeitos apropriados na pressão arterial (cápsulas orais Prod Info DAYPRO®, 2016; comprimidos anal Info Prod ANAPROX®, 2016; Info Prod CALDOLOR® intravenosa) injeção, 2016).</p> | <p>Importante A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves.</p> | <p>O uso concomitante de AINEs e DIÁSTICOS TIAZÍDICOS pode resultar em redução da eficácia diurética e possível nefrotoxicidade.</p> |

Diclofenaco Sódico X Hidroclorotiazida

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|--|---|--|
| <p>O risco de toxicidade renal aumenta com o uso combinado de AINEs e diuréticos e o uso de AINEs com diuréticos tiazídicos reduziu o efeito natriurético do diurético em alguns pacientes. Durante a utilização concomitante de AINEs e diuréticos, monitorize os sinais de agravamento da função renal e assegure a eficácia diurética, incluindo efeitos apropriados na pressão arterial (cápsulas orais Prod Info DAYPRO®, 2016; comprimidos anal Info Prod ANAPROX®, 2016; Info Prod CALDOLOR® intravenosa) injeção, 2016).</p> | <p>Importante A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves.</p> | <p>O uso concomitante de AINEs e DIÁSTICOS TIAZÍDICOS pode resultar em redução da eficácia diurética e possível nefrotoxicidade.</p> |

Aspirina / Carisoprodol X Diazepam

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|--|---|---|
| Monitor de depressão respiratória quando essas drogas são usadas em combinação. Uma redução na dose de um ou de ambos os medicamentos pode ser necessária. | Importante A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves. | O uso concomitante de BENZODIAZEPINAS e RELAXANTES MUSCULARES CENTRALMENTE DE ACÇÃO pode resultar em depressão respiratória |

Cloridrato de Tramadol X Lorazepam

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|---|---|---|
| Reserve o uso concomitante de tramadol e depressores do SNC a pacientes para os quais as alternativas são inadequadas. Se o uso concomitante for necessário, use a menor dose e a menor duração necessária para alcançar as metas do tratamento. Considerar o uso de uma dose menor de tramadol ou o depressor do SNC e acompanhar de perto a sedação e a depressão respiratória (Prod Info ULTRAM® comprimidos orais, 2016; Prod Info CONZIP® cápsulas orais de liberação prolongada, 2016). | Importante A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves. | O uso concomitante de TRAMADOL e DEPRESSORES DO SNC pode resultar em aumento do risco de depressão respiratória e do SNC. |

Fluconazol X Citalopram

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|--|---|--|
| O uso concomitante de medicamentos conhecidos por prolongar o intervalo QT e que são metabolizados pelo CYP3A4, como o citalopram, com o fluconazol é contra-indicado devido ao potencial de efeitos aditivos no risco de eventos adversos cardíacos graves. Adicionalmente, como o fluconazol inibe o metabolismo do citalopram mediado pelo CYP3A4 (Prod Info DIFLUCAN® IV suspensão oral em comprimidos, 2011), o aumento dos efeitos adversos do citalopram, incluindo sinais e sintomas da síndrome da serotonina, pode resultar da co-administração. | Contraindicado Os medicamentos são contraindicados para uso concomitante. | O uso concomitante de CITALOPRAM e FLUCONAZOL pode resultar em aumento do risco de prolongamento do intervalo QT e síndrome serotoninérgica. |

Diprosan/Betatrinta X Diclofenaco Sódico

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|---|---|---|
| A administração concomitante de AINEs com corticosteroides orais pode aumentar o risco de úlcera gastrointestinal ou sangramento. Se for necessária a administração concomitante, monitorizar os sinais de hemorragia (tabletes orais Prod Info DAYPRO®, 2016; comprimidos anal informativos Prod Info ANSAID®, 2016; tablets Info Prod Info ARTHROTEC®, 2016; cápsulas orais Prod Info CELEBREX®, 2016). | Importante A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves. | O uso concomitante de CORTICOSTERÓIDES e AINEs pode resultar em aumento do risco de úlcera gastrointestinal ou sangramento. |

Diprosan/Betatrinta X Nimesulida

| Gestão clínica: | Gravidade | Resumo |
|---|---|---|
| A administração concomitante de AINEs com corticosteroides orais pode aumentar o risco de úlcera gastrointestinal ou sangramento. Se for necessária a administração concomitante, monitorizar os sinais de hemorragia (tabletes orais Prod Info DAYPRO®, 2016; comprimidos anal informativos Prod Info ANSAID®, 2016; tablets Info Prod Info ARTHROTEC®, 2016; cápsulas orais Prod Info CELEBREX®, 2016). | Importante A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves. | O uso concomitante de CORTICOSTERÓIDES e AINEs pode resultar em aumento do risco de úlcera gastrointestinal ou sangramento. |

